



بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی شهریار
Shahryar General Hospital

بیمارستان تخصصی شهریار



سقط

تهیه کننده : عبدالله مسن زاده

سوپروایزر آموزشی

با تأیید : فانم دکتر (قیه بهمت)

(متفحص زنان زایمان)

گروه آموزش سلامت بیمارستان :

https://eitaa.com/shahriyar_salamat_group



تاریخ بازنگری: تابستان ۱۴۰۲

تهدید به سقط: هرگونه ترشح خونی از واژن یا

خونریزی واژینال در طی نیمه اول حاملگی

سقط اجتناب ناپذیر: زمانی که حداقل ۲ تا از علائم

زیر وجود داشته باشند.

۱. پارگی کیسه آب

۲. دیلاتاسیون سرویکس بیش از ۳ سانتیمتر

۳. افاسمان متوسط سرویکس

۴. پایدار ماندن درد علی رغم استفاده از ضد درد

سقط ناکامل: دفع ناکامل محصولات حاملگی قبل از

هفته ۲۰

سقط کامل : خروج کامل همه محصولات حاملگی

قبل از هفته ۲۰م

سقط فراموش شده: باقیماندن محصولات مرده

حاملگی در رحم به مدت چندین هفته

سقط راجعه : ۲ یا بیش از ۲ سقط خودبه خودی

پشت سر هم و پی در پی

منابع:

مامایی و بیماریهای زنان دنفورث

بارداری و زایمان ویلیامز

بیماریهای زنان نواک

علل مادری :

۱. عفونتها

۲. اختلالات رحمی

۳. اختلالات آندوکراین مثل کمبود پروژسترون،

هیپوتیروئیدی و دیابت.

۴. فاکتورهای ایمنولوژیک

۵. مصرف موادی مثل سیگار - الکل - کافئین - در

معرض اشعه و گازهای بیهوشی بودن

۶. بیماری های سیستمیک مزمن

۷. ترومای مستقیم یا غیر مستقیم مثل آمینوسنتز و

نمونه برداری از پرزهای کوریونی (اثر ترومای مینور به

شکم مادر ناشناخته است).

انواع سقط

• خود به خودی

• تهدید به سقط

• سقط اجتناب ناپذیر

• سقط ناکامل

• سقط کامل

• سقط فراموش شده

• سقط راجعه

*در صورت توصیه پزشک به استراحت در منزل با افزایش میزان خونریزی یا ادامه خونریزی (با وجود استراحت)، زن باردار باید به بیمارستان مراجعه مراجعه نماید.

* در صورتی که گروه خون مادر منفی است، پس از سقط جهت تزریق آمپول روگام (RhoGAM)، با پزشک مشورت کنید



۳. افزایش سن پدر
۴. حاملگی در عرض ۳ ماه بعد از تولد یک نوزاد زنده بدنیا آمده

۵. سابقه سقط یا مرده زایی در حاملگی‌های قبلی
نکته: عمدتاً سقط خودبه خود ۳-۱ هفته بعد از مرگ جنین رخ می دهد.

علل سقط:

• علل جنینی

• علل مادری

عوامل جنینی شامل:

الف) رشد غیر طبیعی تخم که در ۴۰٪ موارد اختلال رشد منجر به سقط جنین خود به خود می شود.

ب) ناهنجاری های ارثی و ژنتیکی جنین.

برای زنان باردار که دچار علائم سقط جنین شده چه کاری می توان انجام داد؟

*در صورت وجود هر گونه خونریزی واژینال در دوران بارداری، فوراً به پزشک مراجعه کنید.

* در صورت وجود لکه بینی بدون درد با پزشک مشورت کنید.

سقط چیست
سقط عبارتست از ختم حاملگی به هر وسیله ای قبل از اینکه جنین قدرت زنده ماندن در محیط خارج از رحم را داشته باشد.

سقط ها به دو دسته عمدۀ تقسیم می شوند.

❖ سقط خود به خودی

❖ سقط القاء شده

سقط خود به خودی

❖ عبارتست از ختم حاملگی قبل از هفته ۲۰ ام

حاملگی

❖ زایمان یک جنین مرده یا زنده با وزن کمتر

از ۵۰۰ گرم

۱۰ درصد حاملگی ها با سقط همراهند ، بیش از ۸۰ درصد سقط های خود به خودی در ۳ ماهه اول رخ می دهند و بعد از هفته ۱۲ حاملگی میزان سقط کاهش می یابد.

اگر سقط در ۱۲ هفته اول حاملگی رخ دهد به آن سقط زودرس و اگر بین ۱۲ تا ۲۰ هفته حاملگی رخ دهد به آن سقط دیررس می گویند.

نکته: تخمک گذاری ممکن است ۲ هفته بعد از یک سقط برگردد. بنابراین جلوگیری از بارداری موثر هر چه زودتر بعد از سقط باید شروع شود.

فاکتور های خطر

۱. افزایش تعداد حاملگی

۲. افزایش سن مادر